

予防接種問診票

診察前の体温

℃

氏名No.		フリガナ	
事業所名		氏名	

質問事項	回答欄	
1. 今日受ける予防接種について説明文を読んで理解しましたか。	はい	いいえ
2. 現在、何らかの病気の治療を受けていますか。 * 治療中の病名 () * 内服中の薬剤名 ()	はい	いいえ
3. 今日、身体の具合が悪いところがありますか。 * 症状 ()	はい	いいえ
4. 最近1か月以内に、熱が出たり、病気にかかったりしましたか。 * 病名 ()	はい	いいえ
5. 薬や予防接種、食品、ゼラチン、天然ゴム（ラテックス）製品で発疹や蕁麻疹などのアレルギー症状が出たことがありますか。 * 薬剤名 () * 食品名 () * 他 ()	はい	いいえ
6. 1年以内にけいれん症状が出たことがありますか。	はい	いいえ
7. 他施設で1か月以内に予防接種を行ったか、行う予定はありますか。 * 予防接種名： () * 実施（予定）日： 年 月 日	はい	いいえ
8. 14日以内に新型コロナの予防接種を行ったか、行う予定はありますか。 * 実施（予定）日： 年 月 日	はい	いいえ
9. 今までに黄疽になったことがありますか。	はい	いいえ
10. 1か月以内に家族や周囲で麻疹・風疹・水痘・おたふくかぜの病気の方がいましたか。	はい	いいえ
11. 【2回目以降の予防接種の方のみ】 前回の予防接種後に何か症状（発熱、腫れ、発疹、その他）がありましたか。 * 症状 ()	はい	いいえ
12. 【女性のみ】現在妊娠していますか。（最終月経： 年 月 日）	はい	いいえ

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応について理解した上で、予防接種実施記録に記載されたワクチンの接種を (希望します ・ 希望しません)

年 月 日 被接種者自署

接種年月日		ロット番号	
-------	--	-------	--

予防接種の対象となる病気について

A型肝炎

A型肝炎ウイルスに汚染された食物（主に魚介類）や水を摂取することで感染する病気です。感染すると一過性の急性肝炎を発症し、38℃以上の発熱、全身倦怠、下痢、黄疸症状等が出現します。途上国に長期(1か月以上)滞在する人、特に60歳以下の場合はワクチン接種が推奨され、一定の間隔で2～3回の接種が必要です。

B型肝炎

B型肝炎ウイルスを含む血液あるいは体液と直接接触することにより感染する病気です。健康な成人の感染では、一過性感染が多く、急性肝炎の経過をとるものと不顕性感染（無症状）となるものがあります。急性肝炎では、黄疸や全身倦怠感、発熱などの症状をおこし、一部の人は劇症化（急激に悪化）して命を失うこともあります。また、慢性化することもあります。血液や体液に接触する可能性のある人には特にワクチン接種が推奨され、一定の間隔で2～3回の接種が必要です。

破傷風

破傷風菌は、土の中に潜んでいて、ケガをすると傷口から感染します。発病するとけいれんをおこし、死亡することの多い病気です。けがにより命に関わることもあります。破傷風は発症しても、免疫を獲得せず、予防接種を受けて初めて免疫を獲得します。破傷風ワクチンは三種混合ワクチン（ジフテリア・破傷風・百日咳）に含まれ定期接種は1968年開始で、免疫があっても、最終接種から10年経過した方は、追加接種を推奨し1回の接種で10年間有効な免疫が付きます。定期接種未実施者は3回接種が必要となります。

狂犬病

狂犬病ウイルスに感染している動物に咬まれたり、傷口をなめられたりすることで感染する病気です。全世界に存在しており、発病すると有効な治療はなく、頭痛、発熱から始まり嚥下困難、けいれん等がみられ、呼吸循環不全でほぼ100%死亡します。動物と直接接触する人、動物の多い地域へ行く人で、近くに医療機関がない地域へ行く人は特にワクチン接種が推奨されます。感染後に接種する場合がありますが、事前の接種の場合は基本的には3回の接種が必要です。

日本脳炎

日本脳炎ウイルスを保有する蚊が人を刺すことによって感染する病気です。発症すると6～16日の潜伏期間を経て、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害、けいれんなどの症状をきたします。流行地域に長期滞在する人(主に東南アジアでブタを飼っている農村部)には特にワクチン接種が推奨されます。一定の間隔で2～3回の接種が必要です。既に3回実施している場合は追加接種となります。

予防接種後の注意

- (1) 予防接種を受けた後、10分以内に、急な副反応がおこることがありますので接種後は安静に待機し、体調に変化がないかどうか様子を見てください。
- (2) 入浴可能ですが、接種した部位を強くこすらないでください。
- (3) 接種当日は激しい運動やアルコール摂取を控えてください。
- (4) 接種部位の発赤、痛み・しこり・かゆみ、発熱・倦怠感・頭痛等が起きることがありますが2～3日で収まります。
- (5) 高熱、嘔吐、けいれん(ひきつけ)等、異常があった時には、医療機関を受診し、その結果を当センタへご連絡ください。